

Attapulgate activée

COLOPATHIL®

Adulte

FORMES ET PRESENTATIONS:

Poudre orale en sachets : Adulte: Boîte de 30.

COMPOSITION:

Attapulgate activée: Adulte: p. sachet 3 g - p. boîte 90 g. SORT
DU MEDICAMENT:

Pansement intestinal: non absorbé par voie digestive, il est éliminé par les fèces.

PROPRIETES:

L'attapulgate est un silicate de magnésium et d'aluminium qui constitue un pansement intestinal adsorbant. COLOPATHIL® dispose d'un pouvoir couvrant important. Il tapisse la muqueuse intestinale et constitue à sa surface un film protecteur. L'attapulgate adsorbe les toxines et les gaz irritants et agit comme hémostatique local par activation des facteurs V et XII de la coagulation. COLOPATHIL® est radiotransparent et ne modifie pas la couleur des selles.

INDICATIONS:

Indiqué dans le traitement des colopathies aiguës et chroniques avec accélération du transit intestinal, en particulier diarrhées avec météorisme. L'attapulgate a été proposé en lavement, comme traitement adjuvant dans les rectocolites hémorragiques. COLOPATHIL® peut être administré aux diabétiques et aux enfants.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

La possibilité d'une diminution ou d'un ralentissement de l'absorption de médicaments pris simultanément ne pouvant être exclue, il est recommandé d'administrer tout autre médicament à distance de COLOPATHIL®.

CONTRE-INDICATIONS:

Il n'a pas été signalé de contre-indications à l'attapulgite.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Il est nécessaire d'utiliser COLOPATHIL® avec prudence en cas de mégacôlon et d'altération de la motricité colique.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE:

Adultes:

2 sachets par jour de préférence à jeûn en cas de colopathie;
1 sachet 2 à 3 fois par jour en cas de diarrhée. Boire abondamment. Le contenu de chaque sachet sera mélangé dans un verre d'eau. Aromatisé et édulcoré, COLOPATHIL® est de goût agréable.